Kulturempfehlung

Neuguinea Impatiens IMPACIO®

Steckbrief:

Bei der Eigenzüchtung der pac Impacio® wird auf Einheitlichkeit, gute Verzweigung und hohe Robustheit gegenüber Umweltfaktoren selektiert. Impacio® bietet ein großes Farbspektrum mit vielen großen Einzelblüten.

Topfen:

Topfen zwischen KW 5 - 12
Topf T10,5 – T13

Verkauf:

- Ab Ende April

Substrat:

- P-Substrat
- pH 5,5 – 6,5

Düngung:

Geringer Nährstoffbedarf: keine Vorratsdünger verwenden, EC-Wert 1,2 bis 1,8 nicht überschreiten

Temperatur:

Mittlerer Wärmebedarf; nach der Einwurzlung bei TMT 18°C empfiehlt sich die Weiterkultur bei TMT 16°C.
Abweichungen sind bei entsprechenden Kulturmaßnahmen möglich.

Licht:

Unter mitteleuropäischen Bedingungen nach der Einwurzelungszeit bei vollem Licht kultivieren.

Blüte:

Ab Ende April

Wachstumsregulatoren:

Bonzi 2 ppm, CCC

Stutzen:

Weich 6 – 7 Tage nach Einwurzelung
Weiteres Stutzen nach Bedarf notwendig.

Krankheiten/Schädlinge:

Botrytis, Pythium, Rizoctionia, Weichhautmilben, Läuse, Virus.

Flächenbelegung:

20 - 25 Pflanzen / qm.

Nur Hinweise. PAC Elsner kann nicht für Schäden jeglicher Art verantwortlich gemacht werden, die sich aus den bereitgestellten Informationen ergeben

Elsner pac® Vertriebsgesellschaft mbH | Am Fiebig 14 | 01561 Thiendorf
Phone: +49 35248 3991-0 | E-Mail: info@pac-elsner.com

PASSION AND COMPETENCE